

胃がん手術後にティーエスワンの治療を受ける方へ

治療を受ける前に

あなたは手術で胃がんを取り除くことが出来ましたが、ステージ(進行度)によっては再発することもあります。しかし、ステージが2、3の場合、ティーエスワンというお薬を飲むことで、がんの再発の可能性を少なくすることが分かっています。




ティーエスワンとは

ティーエスワンは日本で開発された飲み薬です。最近の試験によると、ティーエスワンを術後1年服用することで、手術後何もしない場合(定期的な検査のみ)よりも再発率を減らすことが確認されました。

ティーエスワンにはカプセル剤と顆粒剤があります。

●カプセル剤
(実物大)



20mg*



25mg*

●顆粒剤




20mg*



25mg*



※有効成分の量



この試験は、ティーエスワンを服用した529人と何もしなかった530人についての結果ですが、よりご理解をいただくために、「100人中〇〇人」として表現しています。

治療を始めると



ティーエスワン服用のしかた

ティーエスワンは決められた量を**1日2回、朝と夕方、食後30分**をめやすに飲みます。外来受診はおおよそ2週間に1度程度になります。



からだの状態によって担当医の指示により、お薬の量を減らしたり、スケジュールを変更することがあります。

メモ欄

飲み始めると

ティーエスワンを飲み始めると、右のような症状が現れるかもしれません。

症状の現れる時期・頻度のめやす

飲み始め	1週目	2週目	3週目
	<ul style="list-style-type: none"> ● 吐き気がある (10人中3人) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 食欲がおちる (10人中3~4人) ● 口内炎ができる (10人中2人) ● 発疹ができる (10人中1人) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 下痢がおきる (10人中2人) ● 色素沈着がおきる (10人中2人)

● 2週間お休みすることで、これらの症状は改善してきます。ただし、色素沈着は改善が遅れることがあります。外出時は帽子や衣類で直射日光を避けましょう。

※ なお、吐き気、食欲不振、下痢などはお薬だけでなく、手術の影響で現れることもあります。

こんなときは無理に服用せず、できるだけ早く担当医に相談しましょう。



発熱 38℃以上の熱



下痢 1日に4回以上の下痢



口内炎 口内炎や吐き気などで食事が取れない

● それ以外に普段でも病院に行くような症状が出たときは担当医にご相談ください。

● お薬に関するもっと詳しい説明は、医師 薬剤師等がお渡しする「ティーエスワン服用のてびき」をご覧ください。

ティーエスワンの薬剤費

3割負担の場合、1か月の自己負担は約2万5千円~3万5千円になります。なお、保険の種類やお薬の量などにより、費用が異なります。

